

ボツリヌス症しょうについて

ボツリヌス菌きんで起きる
食中毒しょくちゅうどくに気をつけてね!



KIDS キッズボックス BOX

1 ボツリヌス症しょうとは?

ボツリヌス菌きんがつくる毒素どくそによって起きる
病気びょうきです。食品しょくひんが原因げんいんとなるもの(食中毒しょくちゅうどく)は、
主に次の2つです。

乳児ボツリヌス症にゅうじ

主な原因食品おも

ハチミツやハチミツ入りの食品しょくひんです。

主な症状おも

- 便秘べんぴ
- 力ちからが入らない
- お乳ちちを吸う力が弱いちから
- 泣き声なごえが小さい

ボツリヌス食中毒しょくちゅうどく

主な原因食品おも

パックや、かん、びんに詰められた
保存食品ほぞんしょくひん・発酵食品はっこうしょくひんです。(自家製じかせいのもの
がほとんど)

主な症状おも

- 吐き気はげ
- おう吐と
- 下痢げり
- まひ

※症状しょうじょうが重いときは、死亡しぼうすることもあります。

2 予防よぼうするには?

乳児ボツリヌス症にゅうじ

- 1歳さいになる前の赤ちゃんまえには、ハチミツや
ハチミツ入りの食品しょくひんをあげないこと!

ハチミツは
1歳さいを
過ぎてから



ボツリヌス食中毒しょくちゅうどく

- パック等とうがふくらんでいたり、開けて変な
においがしたら、食べないこと!
- 冷蔵保存れいぞうほぞんが必要なものは冷蔵庫れいぞうこに入れよう!
- 食べる前たに加熱まするといよいよ!



- 詳しい内容くわは、[こちら](#)のサイトないようをみてね

右みぎのサイトいっしょで一緒に調べてね!

食品安全委員会

検索

<http://www.fsc.go.jp/>

2019年1月現在